

# Prise en charge odontostomatologique de la femme Enceinte

## Radiographie dentaire

### Pas de Contre indication

#### Recommandations :

- Respecter le principe de justification
- Rassurer la patiente car intérêt de l'examen, modestie de la dose délivrée, éloignement du champ des rayons X du volume utérin (tablier de plomb possible)
- Différer le cone beam, la téléradiographie et le scanner après l'accouchement

## Amalgame dentaire

### Contre indication - Précaution :

- Eviter la dépose des amalgames chez la femme enceinte et allaitante
- L'amalgame est un matériau adapté pour la restauration des dents permanentes postérieures en cas de prévalence carieuse élevée et de lésions multiples et étendues

#### Recommandations :

- Evaluer en fonction de chaque situation clinique la nécessité de pose d'un amalgame ou d'un autre matériau adhésif
- Réaliser le fraisage et le repolissage de l'amalgame sous irrigation/aspiration et autant que possible avec un champ opératoire (digue dentaire)

## Anesthésie dentaire

### Pas de Contre indication

#### Recommandations :

- Utilisation normale de la Lidocaïne, l'Articaïne, la Mépivacaïne au cours de la grossesse et de l'allaitement avec ou sans vasoconstricteur

## Antalgiques - AINS - corticoïdes

### Contre indication :

- formelle de tous les AINS (y compris l'aspirine  $\geq 500$  mg/j) à partir du début du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse, déconseillés les 5 premiers mois.

#### Recommandations :

Quel que soit le terme de la grossesse :

- Antalgiques non opiacés (palier 1) : préférer le paracétamol et pas d'AINS
- Antalgiques opioïdes faibles (palier 2) : préférer l'association paracétamol + codéine au 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestre, contre-indiqué au 3<sup>ème</sup>
- Les glucocorticostéroïdes peuvent être utilisés chez la femme enceinte et allaitante quelle que soit leur voie d'administration, leur posologie et le terme de la grossesse

## Antibiotiques

### Contre indication - Précaution :

- Cyclines contre indiquées
- Josamycine et clarithromycine déconseillées
- Pas de contre indication à la prescription de spiramycine + metronidazole

#### Recommandations :

- On peut prescrire à tous les stades de la grossesse  
En 1<sup>ère</sup> intention : amoxicilline  
En 2<sup>ème</sup> intention : amoxicilline + acide clavulanique

## Antifongiques

### Contre indication :

- Fluconazole

#### Recommandations :

- L'utilisation des antifongiques par voie orale, gingivale est possible quel que soit le terme de la grossesse : miconazole, nystatine, amphotéricine B.
- Mais éviter les excipients alcooliques.

## Référentiels

- Guide des indications et des procédures des examens radiologiques en odontostomatologie.
- HAS-DGSNR-IRSN 2006.
- Anesthésie dentaire injectable (MAJ 04/04/2013) CRAT (centre de référence sur les agents tératogènes).
- Le mercure des amalgames dentaires : recommandation à l'attention des professionnels de santé à respecter lors de l'utilisation des amalgames dentaires ANSM-décembre 2014.
- Lettre au professionnel de santé AFSSAPS février 2009.
- Douleur et grossesse MAJ le 20/03/2014, CRAT (centre de référence des agents tératogènes).
- AFSSAPS médicament anti-infectieux, VIDAL (AMM), CRAT (centre de référence des agents tératogènes)